

# Fusigal

Fusidic Acid & Betamethasone

## COMPOSITION

Each gram cream contains Fusidic Acid BP 20 mg and Betamethasone Valerate BP equivalent to Betamethasone 1 mg.

## PHARMACOLOGY

Fusigal cream combines the potent topical antibacterial action of fusidic acid with the anti-inflammatory and anti-pruritic effects of betamethasone. Betamethasone valerate is a potent topical corticosteroid rapidly effective in those inflammatory dermatoses which normally respond to this form of therapy.

Topical uses of fusidic acid is also active against *Staphylococci*, *Streptococci*, *Corynebacteria*, *Neisseria* and certain *Clostridia*. Activity of fusidic acid enhances in the presence of betamethasone.

## INDICATIONS

Fusigal cream is indicated in eczematous dermatoses with secondary bacterial infections including atopic eczema, discoid eczema, seborrhoeic dermatitis, contact dermatitis, primary irritant dermatitis, psoriasis and discoid lupus erythematoses.

## DOSAGE AND APPLICATION

Apply a small quantity to the affected area twice daily until a satisfactory response is obtained. A single treatment course should not normally exceed two weeks.

## CONTRAINDICATIONS

Should not use with known hypersensitivity to any of the ingredients of Fusigal cream. Do not use in the presence of infections due to non organisms. Due to the content of corticosteroid **Fusigal** cream is contraindicated in the following conditions-

Skin infections primarily caused by bacteria, fungi or virus (such as herpes or varicella), skin manifestations in relation to tuberculosis or syphilis, acne vulgaris and rosacea.

## SIDE EFFECTS

The most frequently reported undesirable effects are various symptoms of application site irritation.

As with other corticosteroids, folliculitis, hypertrichosis, allergic contact dermatitis, depigmentation, although rare, may occur.

## PRECAUTION

High caution should be taken for applying in children. Usage near eye should be in high caution, otherwise glaucoma may occur if enter into eye.

## USE IN PREGNANCY & LACTATION

Safety for use of Fusigal cream during human pregnancy and lactation has not been established. This product should not be used during pregnancy or lactation unless clearly necessary.

## STORAGE

Store in cool and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

## PACKAGING

**Fusigal Cream:** Each Lamitube containing 15 gm cream.

Manufactured by:



**Sharif Pharmaceuticals Ltd.**

Rupganj, Narayanganj, Bangladesh

P12036

# ফুসিগাল

ফুসিডিক এসিড এবং বেটামেথাসন

## উপাদান

ফুসিগাল ক্রীমঃ প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে ফুসিডিক এসিড বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং বেটামেথাসন ভেলেরেট বিপি যা বেটামেথাসন ১ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

## ফার্মাকোলজি

ফুসিগাল ক্রীমের ফুসিডিক এসিড ব্যাকটেরিয়াবিরোধী ও বেটামেথাসন প্রদাহ এবং চুলকানিবিরোধী কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। বেটামেথাসন ভেলেরেট একটি শক্তিশালী ত্বকীয় কর্টিকোস্টেরয়েড যা ত্বকে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহজনিত সমস্যায় নির্দেশিত।

ত্বকে ব্যবহারের ফলে ফুসিডিক এসিড স্ট্যাফাইলোকক্কাই, স্ট্রেপটোকক্কাই, করিনিব্যাকটেরিয়া, নেইসেরিয়া এবং কিছু ক্লসট্রিডিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। বেটামেথাসনের উপস্থিতিতে ফুসিডিক এসিডের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

## নির্দেশনা

ফুসিগাল ক্রীম প্রদাহজনিত চর্মরোগের জন্য নির্দেশিত যেখানে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা আছে। যেমনঃ এটপিক এক্জিমা, ডিসকয়েড এক্জিমা, সেবরিক ডার্মাটাইটিস, কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, সোরিয়াসিস, ডিসকয়েড লুপাস ইরাইথেমেটোসেস।

## মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

সামান্য পরিমাণ ক্রীম সন্তোষজনক ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত স্থানে দিনে দুইবার প্রয়োগ করুন। তবে একটানা ২ সপ্তাহের বেশী ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত হবে না।

## বিপরীত নির্দেশনা

ফুসিগাল ক্রীমের যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতায় এটি বিপরীত নির্দেশিত। নন-সেনসেটিভ অর্গানিজম দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণে এটি ব্যবহার করা যাবে না। ফুসিগাল ক্রীমে কর্টিকোস্টেরয়েড থাকার কারণে নিম্নোক্ত অবস্থায় এটি বিপরীত নির্দেশিত যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক অথবা ভাইরাস (হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া, ভেরিসেলা) দ্বারা সংঘটিত ত্বকের ক্ষতে, টিউবারকিউলোসিস অথবা সিফিলিস জনিত কারণে ত্বকের প্রতীয়মান অবস্থায়, একনি ভালগারিস এবং রোজাসিয়াতে।

## পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

বেশীরাঙ্গা ক্ষেত্রে প্রয়োগস্থলে ক্ষণস্থায়ী ও মৃদুধরণের জ্বালাপোড়া, চুলকানি ও লালচে ভাব দেখা যেতে পারে।

ঔষধটি অন্যান্য কর্টিকোস্টেরয়েডের মত ফলিকিউলাইটিস, হাইপারট্রাইকোসিস, এলার্জিক কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস ও ত্বকের রং পরিবর্তন ইত্যাদি কদাচিৎ হতে পারে।

## সতর্কতা

শিশুদের ক্ষেত্রে এটি খুবই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। চোখের নিকটবর্তী স্থানে অতি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। চোখের ভেতর প্রবেশ করলে গ্লুকোমা হতে পারে।

## গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে এর নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তাই একান্তই বাধ্য না হলে গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এটা দেয়া যাবে না।

## সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্কস্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## সরবরাহ

ফুসিগাল ক্রীমঃ প্রতিটি ল্যামিটিউবে রয়েছে ১৫ গ্রাম ক্রীম।

পঞ্জিকারক :



শরীফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

P12036