

Verizin

Levocetirizine Dihydrochloride

COMPOSITION

Verizin 5 Tablet: Each film-coated tablet contains Levocetirizine Dihydrochloride INN 5 mg.

PHARMACOLOGY

Verizin Tablet is a preparation of Levocetirizine Dihydrochloride. Levocetirizine is the active (levo) isomer of Cetirizine. It is a new highly effective and well-tolerated non-sedating antihistamine with potent antiallergic properties. It has a two-fold higher affinity for H₁-receptors than Cetirizine. Levocetirizine has a rapid and long-lasting action, allowing once-a-day administration.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Treatment of symptoms associated with allergic conditions such as seasonal allergic rhinitis, perennial allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Adults and children 11-12 years of age and older: 5 mg once daily in the evening.

Children 6 to 11 years of age : 2.5 mg once daily in the evening

Children 6 months to 5 years of age : 1.25 mg once daily in the evening

Renal Impairment : Adjust the dose in patients of 12 years of age and older with decreased renal function

CONTRAINDICATIONS

Verizin is contraindicated in patients who are hypersensitive to this medication or to any of its ingredients.

SIDE EFFECTS

Generally Levocetirizine is well tolerated. However, a few side effects like headache, dry mouth and fatigue and skin rash have been reported rarely.

PRECAUTION

Avoid engaging in hazardous occupations requiring complete mental alertness such as driving or operating machinery when taking Levocetirizine hydrochloride.

Avoid concurrent use of alcohol or other central nervous system depressants with Levocetirizine hydrochloride.

USE IN PREGNANCY & LACTATION

Pregnancy: The safety of Levocetirizine in pregnancy has not been established. Therefore, it should be used with caution during pregnancy and only if the benefits to the mother outweigh any risks to the fetus.

Lactation: Levocetirizine passes into breast milk. So, it should be used with caution in nursing mothers and only if the expected benefit to the mother is greater than the possible risk to the nursing infant.

DRUG INTERACTION

No clinically important drug interactions have been reported.

STORAGE

Store below 30°C., protect from light & moisture. Keep all medicine out of the reach of children.

PACKING

Verizin 5 Tablet: Each box contains 10 x 10 tablets in Alu-PVC strips.



Manufactured by:

SHARIF

Pharmaceuticals Ltd.

Rupganj, Narayanganj, Bangladesh

P12009

ভেরিজিন

লিভোসেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড

উপাদান

ভেরিজিন ৫ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে লিভোসেটিরিজিন ডাই হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন ৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজী

লিভোসেটিরিজিন হচ্ছে সেটিরিজিনের একটি সক্রিয় (লিভো) আইসোমার। ইহা একটি নতুন, খুবই কার্যকরী এবং সুসহনীয় নন-সিডেটিং এন্টিহিস্টামিন, যার শক্তিশালী এন্টিএলার্জিক কর্মক্ষমতা রয়েছে। ইহার এইচ₁-রিসেপটরের সাথে যুক্ত হবার ক্ষমতা সেটিরিজিনের দ্বিগুণ। লিভোসেটিরিজিনের কর্মক্ষমতা দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী, তাই দিনে একবার সেবন করলেই চলে।

নির্দেশনা

এলার্জিক অবস্থা যেমন, সিজনাল রাইনাইটিস, পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস ও ক্রনিক ইডিওপ্যাথিক আর্টিকারিয়ার উপসর্গসমূহ নিরাময়ে নির্দেশিত।

সেবনবিধি ও মাত্রা

প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১১-১২ বছরের অধিক বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রেঃ প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. (রাতে)।

৬ থেকে ১১ বছরের চেয়ে কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রেঃ প্রতিদিন ২.৫ মি.গ্রা. (রাতে)।

৬ মাস থেকে ৬ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রেঃ প্রতিদিন ১.২৫ মি.গ্রা. (রাতে)।

বিপরীত নির্দেশনা

যে সকল রোগী এই ঔষধ বা এর যে কোন একটি উপাদানের প্রতি অতিসংবেদী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণত লিভোসেটিরিজিন সুসহনীয়। তবে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন - মাথাব্যথা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, অবসাদ ও ত্বকে র্যাশ ইত্যাদি দেখা গেছে।

সতর্কতা

লিভোসেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড গ্রহণের সময় গাড়ী চালনা বা যে কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিরত থাকুন।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায়ঃ গর্ভাবস্থায় লিভোসেটিরিজিন নিরাপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই ঋণের ক্ষতির চেয়ে মায়ের উপকার বেশী বিবেচিত হলে, সতর্কতার সাথে গর্ভাবস্থায় লিভোসেটিরিজিন ব্যবহার করা উচিত।

স্তন্যদানকালেঃ লিভোসেটিরিজিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যপানরত শিশুর বুকের চেয়ে স্তন্যদানকারী মায়ের উপকার বেশী পাবার সম্ভাবনা থাকলে সতর্কতার সাথে লিভোসেটিরিজিন ব্যবহার করা উচিত।

ড্রাগ ইন্টারাকশন

কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, ৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্যাকিং

ভেরিজিন ৫ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১০ x ১০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিসি স্ট্রীপে।



প্রস্তুতকারকঃ

SHARIF

Pharmaceuticals Ltd.

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

P12009