

Fentigal VT 600

Fenticonazole Nitrate BP 600 mg

COMPOSITION:

Fentigal VT 600: Each vaginal tablet contains Fenticonazole Nitrate BP 600 mg.

PHARMACOLOGY:

Fenticonazole is an imidazole antifungal, active against a range of organisms including *dermatophyte pathogens*, *Malassezia furfur* (Tinea versicolor) and *Candida albicans*.

It inhibits the production of a chemical called ergosterol, which is a component of the fungal cell membrane. Damage to this membrane cannot be repaired and this interferes with the fungal cell's ability to reproduce, hence the infection is controlled.

INDICATION:

Fentigal VT 600 is indicated for:

- Vulvovaginal candidiasis
- Trichomoniasis
- Mixed Vaginal infections caused by *Candida Albicans* & *Trichomonas vaginalis*

DOSAGE & APPLICATION:

Fentigal VT 600 is used in Trichomonas or mixed (Trichomonas and Candida albicans) vaginal infections:

One 600 mg VT (followed by a second administration 24 hours later, if necessary).

Candida albicans infections:

One single 600 mg VT administration in the evening. Should the symptoms persist, a second administration may be repeated after three days. The tablet must be introduced deep into the vagina and pushed well up to the fornix. To avoid re-infection, it is recommended that the partner undergoes concurrent treatment with Fenticonazole Cream or similar Azole Cream.

DIRECTION FOR USE



1. Pull out plunger "A" until it stops. Place a vaginal tablet into the applicator "B".
2. Insert applicator "A" containing the tablet carefully as deeply as possible into the vagina (best lying on your back).
3. Push plunger "A" until it stops, there by depositing the tablet into the vagina. Remove the applicator.
4. After use, remove plunger "A" completely by pulling it out of the applicator "B". Then wash it in warm (not boiling) soapy water, rinse & dry carefully.

Note: Pregnant woman must follow physician's instructions.

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to Fenticonazole or any component of the formulation.

SIDE EFFECTS:

After intravaginal administration, slight transient burning may occasionally occur, which usually disappears rapidly.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION:

Since there is no experience of use during pregnancy or lactation, So Fenticonazole should not be used without physician's advice.

DRUG INTERACTION:

Not investigated. Since systemic absorption of Fenticonazole after application is low, interactions with other drugs are unlikely.

STORAGE:

Store in a cool and dry place, protected from light. Keep away from children.

PACKAGING:

Fentigal VT 600: Each box contains 1's/2's/3's/4's tablet in Alu-Alu blister with an applicator.

Manufactured by:



Sharif Pharmaceuticals Ltd.
Rupganj, Narayanganj, Bangladesh

ফেন্টিগাল ভিটি ৬০০

ফেন্টিকোনাজল নাইট্রেট বিপি ৬০০ মি. গ্রা.

উপাদানঃ

ফেন্টিগাল ভিটি ৬০০ঃ প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ফেন্টিকোনাজল নাইট্রেট বিপি ৬০০ মি. গ্রা.।

ফার্মাকোলজিঃ

ফেন্টিকোনাজল হলো একটি ইমিডাজল এন্টিফাংগাল এজেন্ট যা বিভিন্ন রকম জীবাণুর বিপরীতে যেমন ডারমেটোফাইট প্যাথোজেনস, ম্যালাসেজিয়া ফারফার (টিনিয়া ভারসিকালার) এবং ক্যান্ডিডা এলবিকানস এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর।

ইহা ফাংগাল কোষীয় বিল্টীর একটি রাসায়নিক উপাদান আরগোস্টেরলের উৎপাদন বন্ধ করে। এর ফলে ছত্রাকের কোষীয় বিল্টী নষ্ট হয়ে যায় যা পুনরায় আর উৎপন্ন হতে পারে না। এভাবেই ফাংগালের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

নির্দেশনাঃ

ফেন্টিগাল ভিটি ৬০০ নিম্নোক্ত রোগের ক্ষেত্রে নির্দেশিতঃ

- ভলভোভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস
- ট্রাইকোমোনিয়াসিস
- মিশ্রভ্যাজাইনাল সংক্রমণে যা ক্যান্ডিডা অ্যালবিকানস ও ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস এর সংমিশ্রণে সংঘটিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধিঃ


ফেন্টিগাল ভিটি ৬০০ ট্রাইকোমোনাস অথবা সংমিশ্রিত (ট্রাইকোমোনাস ও ক্যান্ডিডা অ্যালবিকানাস এর সংক্রমণে)ঃ

একটি ৬০০ মি.গ্রা. ভিটি (প্রয়োজনবোধে ২৪ ঘন্টা পর ২য় বার প্রয়োগ করা যেতে পারে)।

ক্যান্ডিডা অ্যালবিকানাস এর সংক্রমণেঃ একটি ৬০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট সন্ধ্যায় নির্দেশিত। যদি লক্ষণ/উপসর্গ বজায় থাকে, তবে ৩ দিন পর ২য় বার প্রয়োগ করতে হবে।

ট্যাবলেটটি ভ্যাজাইনাল গভীরে প্রবেশ করাতে হবে এবং ঠেলে ফর্নিজ পর্যন্ত নিতে হবে। পুনরায় সংক্রমণ রোধে, সঙ্গীকে ফেন্টিকোনাজল ক্রীম অথবা একই প্রকৃতির অন্য এজোল ক্রীম দিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

ব্যবহার নির্দেশনাঃ



1. প্রাজারটি না থামা পর্যন্ত চাপ দন্ত "A" টানুন। একটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট এপ্লিকটর "B" এর মধ্যে রাখুন।
2. ট্যাবলেট সহ এপ্লিকটরটি যোনির যত গভীরে সম্ভব প্রবেশ করান। (শোয়া অবস্থায় ট্যাবলেটটি যোনির ভিতরে জমা হয়, এপ্লিকটরটি সরিয়ে ফেলুন।
3. প্রাজারটি না থামা পর্যন্ত চাপ দন্ত "A" তে চাপ দিন যেন ট্যাবলেটটি যোনির ভিতরে জমা হয়, এপ্লিকটরটি সরিয়ে ফেলুন।
4. ব্যবহার শেষ হলে এপ্লিকটর "B" থেকে চাপদন্ত "A" সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলুন। তারপর উষ্ণ (ফুটন্ত নয়) সাবান পানিতে ভালভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিন।

পাদটীকাঃ গর্ভবতী মহিলারা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

বিপরীত নির্দেশনাঃ

ফেন্টিকোনাজল অথবা ইহার যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতায় ফেন্টিকোনাজল বিপরীত নির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

ভ্যাজাইনাল অভ্যন্তরে ব্যবহারের ফলে কদাচিৎ ক্ষণস্থায়ী জ্বালাপোড়া হতে পারে, যা হালকা শীঘ্রই নিরাময় হয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহারঃ

যেহেতু গর্ভাবস্থায় অথবা স্তন্যদানকালে ইহার ব্যবহারের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সেহেতু ফেন্টিকোনাজল চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।

ড্রাগ ইন্টারাকশনঃ

পরীক্ষিত নয়। যেহেতু ফেন্টিকোনাজলের সিস্টেমিক শোষণ খুবই কম তাই অন্য ওষুধের সাথে ইন্টারাকশন নাই।

সংরক্ষণঃ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। উষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

ফেন্টিগাল ভিটি ৬০০ঃ প্রতিটি প্যাকে আছে ১টি এপ্লিকটর সহ ১টি/২টি/৩টি/৪টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টারে।

প্রস্তুতকারকঃ



শরীফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।