

Clotzol

Clotrimazole BP

COMPOSITION :

Clotzol cream : Each gram cream contains 10 mg Clotrimazole BP.

PHARMACOLOGY:

Clotrimazole is a broad spectrum antifungal. It also exhibits activity against *Trichomonas*, *Staphylococci*, *Streptococci* and *Bacteroides*.

INDICATION:

The confirmed indication for Clotzol includes :

- All dermatomycoses due to dermatophytes (e.g. *Trichophyton species*)
- All dermatomycoses due to yeasts (*Candida species*)
- Dermatomycoses due to moulds and other fungi
- Skin diseases showing superinfections with these fungi

These dermatomycoses and skin diseases listed above include interdigital mycoses (e.g. athlete's foot), paronychia (associated with nail mycoses), mycoses in skin folds, *Candida vulvitis*, *Candida balanitis*, *Pityriasis versicolor*, *Erythrasma*.

DOSAGE AND APPLICATION:

Clotzol cream should be thinly applied 2-3 times daily to the diseased sites and rubbed in. On account of the excellent efficacy, a small amount of cream is usually sufficient for an area about the size of the palm.

For the treatment to become a complete success, reliable and sufficiently long application of Clotzol cream is important. The duration of treatment varies; it depends among other factors on the extent and localization of the disease.

Dermatomycoses: 3-4 weeks

Candida vulvitis and *Candida balanitis*: 1-2 weeks

Erythrasma and *Pityriasis versicolor* approx: 3 weeks

In fungal infection of the feet, to prevent relapse, treatment should be continued for about 2 weeks beyond the disappearance of all signs of disease.

After washing, the feet should be thoroughly dried (particularly spaces between the toes).

CONTRAINDICATION:

Hypersensitivity to Clotrimazole.

SIDE EFFECTS:

When applied topically, Clotrimazole cream is well tolerated. With external application systemic effects are not observed. Local irritation or burning sensation may occur in a very few cases but these symptoms are not considered harmful.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION:

It is recommended that Clotrimazole should be used in pregnancy only when considered necessary by the physician.

DRUG INTERACTION:

No information is available.

STORAGE:

Store in a cool and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

PACKING:

Clotzol cream : Each lami tube contains 10/20 g of cream.

Manufactured by:



Sharif Pharmaceuticals Ltd
Rupganj, Narayanganj, Bangladesh.

ক্লটজল

ক্লোট্রিমাঞ্জল বিপি

উপাদান :

ক্লটজল ক্রীম : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে ১০ মি.গ্রা. ক্লোট্রিমাঞ্জল বিপি।

ফার্মাকোলজি :

ক্লোট্রিমাঞ্জল একটি বিস্তৃত বর্ণালীর ছত্রাকনাশক। তাছাড়া এটি ট্রাইকোমোনাস, স্টেফাইলোকক্কাই, স্ট্রেপটোকক্কাই এবং ব্যাকটেরিয়েডস এর বিরুদ্ধে কার্যকর।

নির্দেশনা :

নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহে ক্লটজল নিশ্চিতভাবে কার্যকর :

- ডার্মাটোফাইটিস (যেমন ট্রাইকোফাইটন প্রজাতি) দ্বারা সৃষ্ট সব ডার্মাটোমাইকোসেস
- ইন্ড (যেমন ক্যান্ডিডা প্রজাতি) দ্বারা সৃষ্ট সব ডার্মাটোমাইকোসেস
- মোন্ডস ও অন্যান্য ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট ডার্মাটোমাইকোসেস
- ডুকের রোগসমূহ যেগুলোতে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ সমূহ দেখা যায়

উপরে উল্লেখিত ডার্মাটোমাইকোসেসগুলো ও ডুকের রোগের মধ্যে আছে ইন্টারডিজিটাল মাইকোসেস (যেমন অ্যাথলেট ফুট), প্যারোনাইকিয়া (নখের মাইকোসেস এর ক্ষেত্রে), ডুকের ভাঁজের মাইকোসেস, ক্যান্ডিডা ভালভাইটিস, ক্যান্ডিডা ব্যালানাইটিস, পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার ও ইরাইথ্রাসমা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :

ক্লটজল ক্রীম দৈনিক ২ থেকে ৩ বার আক্রান্ত স্থানে পাতলা করে মালিশ করতে হবে। কার্যকারিতা ভাল হওয়ায় সামান্য পরিমাণ ক্রীম হাতের তালু পরিমাণ জায়গায় ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট।

চিকিৎসার সম্পূর্ণ সফলতার জন্য ক্লটজল ক্রীম পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য ব্যবহার করা জরুরী। চিকিৎসার সময়সীমা রোগের অবস্থা এবং অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

ডার্মাটোমাইকোসেস : ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ

ক্যান্ডিডা ভালভাইটিস এবং ক্যান্ডিডা ব্যালানাইটিস : ১ থেকে ২ সপ্তাহ

ইরাইথ্রাসমা এবং পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার : ৩ সপ্তাহ

পায়ের ছত্রাক সংক্রমণের ক্ষেত্রে পুনঃসংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অসুখের সমস্ত লক্ষণ দূর হওয়ার পরও আরো ২ সপ্তাহ ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া উচিত। পা ধোয়ার পর ভালভাবে শুকিয়ে নেওয়া উচিত (বিশেষ করে পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ)।

বিপরীত নির্দেশনা :

ক্লোট্রিমাঞ্জলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে বিপরীত নির্দেশিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :

ডুকে ব্যবহৃত ক্লোট্রিমাঞ্জল ক্রীম খুব সহনশীল। দেহের বাইরে ব্যবহৃত হলে সিস্টেমিক কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। খুবই কম ক্ষেত্রে প্রয়োগস্থানে চুলকানি বা জ্বালা পোড়া হতে পারে কিন্তু এটা ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয় না।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার :

চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে ক্লোট্রিমাঞ্জল গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

ড্রাগ ইন্টার্যাকশন :

এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ :

আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্যাকিং :

ক্লটজল ক্রীম : প্রতি ল্যামি টিউবে আছে ১০/২০ গ্রাম ক্রীম।

প্রস্তুতকারক :



শরীফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।