

COMPOSITION

Picaso 10 Tablet: Each Tablet contains Sodium Picosulfate BP 10 mg.

Picaso Oral Solution: Each 5 ml oral solution contains Sodium Picosulfate BP 5 mg.

PHARMACOLOGY

Sodium picosulfate is a triarylmethane group derivative stimulant laxative. After oral administration it is activated by the colonic bacteria and acts locally in the colon. The active form then stimulates the nerve endings of the intestinal wall and results in colonic peristalsis with promotion of accumulation of water and electrolytes in the colonic lumen. This results in stimulation of defecation, reduction of transit time and softening of the stool. Stimulation of the rectum causes increased motility and a feeling of rectal fullness. The rectal effect may help to restore the "call to stool".

INDICATIONS

Short term relief of prolonged and recurrent constipation and for the management of constipation of any etiology.

DOSEAGE & ADMINISTRATION

For oral administration. The following dosages are **recommended to be taken at night** to produce evacuation the following morning. It is recommended to start with the lowest dose. The dose may be adjusted up to the maximum recommended dose to produce regular stools. The maximum recommended daily dose should not be exceeded:

Age	Dose: Picaso 10 Tablet	Dose: Picaso Oral Solution
Adults and children over 10 years of age	5-10 mg per day.	5-10 ml or one to two teaspoonful per day.
Children aged 4-10 years	2.5-5 mg per day.	2.5-5 ml or Half to one teaspoonful per day.
Children under 4 years of age		0.25 ml/kg body weight per day.

CONTRAINDICATIONS

Ileus or intestinal obstruction, severe painful and/or feverish acute abdominal conditions (e.g. appendicitis) potentially associated with nausea and vomiting, acute inflammatory bowel diseases, severe dehydration, known hypersensitivity to Sodium Picosulfate or any other component of the product.

PRECAUTIONS AND WARNING

Prolonged excessive use may lead to fluid and electrolyte imbalance and hypokalemia. It should not be taken by children under 10 years without medical advice. Harmful for those suffering from alcoholism. To be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as patients with liver disease or epilepsy.

SIDE EFFECTS

Hypersensitivity, dizziness, syncope, vasovagal response, gastrointestinal disorders, diarrhea, abdominal pain and abdominal cramps, nausea, vomiting.

PREGNANCY

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Long experience has shown no evidence of undesirable or damaging effects during pregnancy.

LACTATION

Clinical data show that neither the active moiety of sodium Picosulfate (BHPM or bis-(p hydroxyphenyl)-pyridyl-2-methane) nor its glucuronides are excreted into the milk of healthy lactating females.

DRUG INTERACTION

The concomitant use of diuretics or adreno-corticosteroids may increase the risk of electrolyte imbalance if excessive doses are taken. Concurrent administration of antibiotics may reduce the laxative action of this product.

OVERDOSES

Laxatives when taken in chronic over dosage may cause chronic diarrhea, abdominal pain, hypokalemia, secondary hyperaldosteronism and renal calculi. Renal tubular damage, metabolic alkalosis and muscle weakness secondary to hypokalemia have also been described in association with chronic laxative abuse.

STORAGE

Store below 30°C temperature, protected from light & moisture. Keep all the medicines out of the reach of children.

PACKAGING

Picaso 10 Tablet: Each box contains 3x10 Tablets in Alu-Alu blister pack.

Picaso Oral Solution: Each bottle contains 100 ml Oral Solution.

Manufactured by:



SHARIF
Pharmaceuticals Ltd.

Rupganj, Narayanganj, Bangladesh

P12209

উপাদান

পিকাসো ১০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম পিকোসালফেট বিপি ১০ মি.গ্রা.।

পিকাসো ওরাল সলিউশনঃ প্রতি ৫ মি.লি. ওরাল সলিউশনে আছে সোডিয়াম পিকোসালফেট বিপি ৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

সোডিয়াম পিকোসালফেট একটি ট্রাইএরাইলমিথেন গ্রুপ এর স্টিমুল্যান্ট ল্যাক্সেটিভ। এটি গ্রহনের পর বৃহদন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সক্রিয় ফলে বৃহদন্ত্রেই কাজ করে। সক্রিয় অবস্থায় সোডিয়াম পিকোসালফেট অত্র এন্টারের স্নায়ু প্রান্তকে উদ্দীপনা দেয়, বৃহদন্ত্রের লুমেনে পানি ও ইলেক্ট্রলাইটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং পেরিস্টালিসিস ত্বরান্বিত হয়। ফলশ্রুতিতে মল নরম হয়ে দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয় এবং মলাশয়ের পূর্ণতা অনুভূত হয়। মলাশয়ের এই প্রভাব মল ত্যাগ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

নির্দেশনা

পুরাতন বা দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য সহ যেকোন কারণে সৃষ্ট সকল প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য গ্রহিতকারে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি

রাতে ঘুমোনার আগে বয়স অনুযায়ী নিম্ন লিখিত ডোজ গ্রহণ করলে পরের দিন সকালে মল ত্যাগ ত্বরান্বিত হবে। এটি সর্বনিম্ন ডোজ থেকে শুরু করা উচিত। নিয়মিত মল ত্যাগের জন্য সর্বোচ্চ নির্দেশিত ডোজ গ্রহণ করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ নির্দেশিত দৈনিক ডোজ অতিক্রম করা উচিত নয়।

বয়স	ডোজঃ পিকাসো ১০ ট্যাবলেট	ডোজঃ পিকাসো ওরাল সলিউশন
প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু (১০ বছরের বেশী)	প্রতিদিন ৫-১০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৫-১০ মি.লি. অথবা ১-২ চা চামচ
শিশু (৪ বছর - ১০ বছর)	প্রতিদিন ২.৫-৫ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ২.৫-৫ মি.লি. অথবা ১/২-১ চা চামচ
শিশু ৪ বছরের কম		প্রতিদিন ০.২৫ মি.লি. প্রতি কেজি ওজনের জন্য

প্রতি নির্দেশনা

সোডিয়াম পিকোসালফেট অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। এছাড়া তীব্র ডিহাইড্রেশন, আন্ত্রিক প্রদাহ, অস্ত্রের বায়ুস্ফুতা, এ্যাপেনডিসাইটিস এর কারণে বমিবমি ভাব।

সতর্কতা

অধিক মাত্রায় দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ফ্লুইড ও ইলেক্ট্রলাইট ভারসাম্য হীনতা এবং হাইপোক্যালিমিয়া হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের গ্রহণ করা উচিত নয়। এ্যালকোহল গ্রহণকারীদের জন্য ক্ষতিকর। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া শিশু, স্ত্রী রোগী এবং লিভার রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অতি সংবেদনশীলতা, মাথা ঘোরা, সাময়িক সংজ্ঞাহীনতা, ভ্যাসোভাগাল প্রতিক্রিয়া, পরিপাকতন্ত্রের জটিলতা, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা এবং বমিবমি ভাব।

গর্ভকালীন ব্যবহার

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও সূনিয়ন্ত্রিত গবেষণা নেই। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, গর্ভকালীন সময়ে এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই।

স্তন্যদানকালীন ব্যবহার

সোডিয়াম পিকোসালফেট মাতৃদুগ্ধের সাথে নির্গত হয় না।

অন্যান্য গুণ্ধের সাথে ক্রিয়া

ডাই-ইউরেটিকস অথবা এডরেনো-করটিকোস্টেরয়েড সোডিয়াম পিকোসালফেট এর সাথে অধিক মাত্রায় গ্রহণের ফলে ইলেক্ট্রলাইট ভারসাম্য হীনতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এন্টিবায়োটিকের সাথে গ্রহণ করলে এই গুণ্ধের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

মাত্রাধিক্য

অতি মাত্রায় দীর্ঘদিন ল্যাক্সেটিভ গ্রহণ করলে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, পেট ব্যথা, হাইপোক্যালিমিয়া, সেকেন্ডারি হাইপার-অ্যালডোস্টেরোনিজম এবং রেনাল ক্যালকুলি হতে পারে। দীর্ঘ দিন ল্যাক্সেটিভ অপব্যবহারের ফলে রেনাল টিউবুলার ডায়ামেজ, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এবং সেকেন্ডারি পেশী দুর্বলতা থেকে হাইপোক্যালিমিয়া হতে পারে।

সংরক্ষণ

আলো ও অর্দ্রতা থেকে দূরে, ৩০° সেঃ তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করুন। সকল গুণ্ধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

পিকাসো ১০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাক্সে অ্যালু-অ্যালু ক্লিস্টার প্যাক এ আছে ৩x১০ টি ট্যাবলেট।

পিকাসো ওরাল সলিউশনঃ প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. ওরাল সলিউশন।

প্রস্তুতকারকঃ



SHARIF
Pharmaceuticals Ltd.

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

P12209